



**دینے کے اقدامات EPINEPHRINE**




1. ہمیشہ معیاری احتیاطی تدابیر اختیار کیجیئے۔
2. Epinephrine کا ٹیکہ فوری طور لگائیں۔ لگانے کی بدایات ذیل میں ملاحظہ کیجیئے۔ ٹیکے کا وقت نوٹ کیجیئے۔
3. 911 کال کیجیئے۔
4. متاثرہ شخص کی ٹانگیں اونچی رکھتے ہوئے سیدھا لٹائیں، جسم گرم رکھیں، یا آرام دہ حالت میں رکھیں۔
5. دوسرا دو افراد کیجیئے اگر حکم دیا گیا ہے:
6. اگر طالب علم بے بوش بوجاتا ہے، تو سانس چیک کیجیئے اور ضرورت پڑنے پر مصنوعی تنفس شروع کیجیئے۔
7. والد یا والدہ (والدین) یا ایمرجنسی روابط کو مطلع کیجیئے۔
8. اگر حکم دیا گیا ہے اور طالب علم کا نام، اپنے کا وقت اور تاریخ لکھیں۔
9. ادویات کے چارٹ پر epinephrine کے ابھی تک نہیں پہنچا تو epinephrine کا ٹیکہ دوبارہ لگائیں۔
10. ادویات کے چارٹ پر epinephrine لگانے کا اندر ادا کیجیئے۔
11. استعمال شدہ اپی نیفرين EMS یا والدین کے ساتھ بھیجیں۔
12. اگر طالب علم کو EMS کے ذریعہ بھیجا گیا ہے تو، موجودہ ایمرجنسی کیٹر کارڈ کی نقل فراہم کیجیئے۔

ایبی نیفرين کا مقام:

انفرادی تحفظات:

دیگر:

 بیلتھ روم خود رکھنا دیگر:

<input type="checkbox"/> EPIPEN® AUTOINJECTOR	<input type="checkbox"/> GENERIC EPINEPHRINE AUTOINJECTOR	<input type="checkbox"/> AUVI-Q® AUTOINJECTOR	<input type="checkbox"/> TEVA GENERIC AUTOINJECTOR
<p><b>DIRECTIONS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remove EpiPen Auto-Injector from plastic carrying case.</li> <li>2. Pull off blue safety release cap.</li> <li>3. Hold leg to stabilize.</li> <li>4. Place orange tip against mid-outer thigh and firmly push. <u>Press firmly and hold for 3 seconds.</u></li> <li>5. Remove and massage the area for 10 seconds.</li> </ol>   <p><b>DIRECTIONS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remove the outer case.</li> <li>2. Remove both end caps (1 and 2).</li> <li>3. Hold the leg to stabilize.</li> <li>4. Place rounded tip against mid-outer thigh.</li> <li>5. Press down hard until needle penetrates. <u>Hold for 10 seconds.</u></li> <li>6. Remove and massage the area for 10 seconds.</li> <li>7. Needle will be exposed; dispose of per training.</li> </ol>	<p><b>DIRECTIONS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remove the outer case; voice command automatically activates.</li> <li>2. Pull off red safety guard.</li> <li>3. Hold leg to stabilize.</li> <li>4. Place black end against mid-outer thigh.</li> <li>5. Press firmly and hold for 2 seconds.</li> <li>6. Remove and massage the area for 10 seconds.</li> </ol>  	<p><b>DIRECTIONS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. There is no outer case for this device.</li> <li>2. Twist the yellow or green cap in the direction of the "twist arrow" to remove cap.</li> <li>3. Pull off the blue safety release cap.</li> <li>4. Hold leg to stabilize.</li> <li>5. Place orange tip against mid-outer thigh and firmly push until you hear a click. Hold firmly in place for 3 seconds.</li> <li>6. Remove and massage the area for 10 seconds.</li> </ol>	<p><b>DIRECTIONS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remove the outer case.</li> <li>2. Twist the yellow or green cap in the direction of the "twist arrow" to remove cap.</li> <li>3. Pull off the blue safety release cap.</li> <li>4. Hold leg to stabilize.</li> <li>5. Place orange tip against mid-outer thigh and firmly push until you hear a click. Hold firmly in place for 3 seconds.</li> <li>6. Remove and massage the area for 10 seconds.</li> </ol>

**استعمال کے متعلق، والد یا والدہ / سرپرست کیلئے معلومات EPINEPHRINE**

1. صرف معالج اور والد/ والدہ یا سرپرست کے دستخط شدہ مختار نامہ کی صورت میں بی اسکول میں، اسکول کے زیر انتظام سرگرمیوں کے دوران یا SACC میں دی جاسکتی ہے۔
2. یہ فارم لازمی طور پر بیلتھ روم میں فائل میں لگا بونا چاہئے یا کسی منظور شدہ جگہ پر موجود ہونا چاہئے۔ پارٹ II میں معالج یا ڈاکٹر کا آرڈر حاصل کرنا والد/ والدہ یا سرپرست کی ذمہ داری ہے۔ طالب علم کیلئے جو SACC میں شرکت کرتا ہے، epinephrine مختار نامہ لازمی طور پر SACC کے پاس فائل میں بونا چاہئے۔
3. جب کیہی بھی دوا کی خوارک میں تبدیلی یا بر نئے تعییبی سال کے موقع پر یا اس کیفیت میں تبدیلی جس کے تحت ایبی نیفرين کی خوارک دی جاتی ہے، کی صورت میں نیا مختار نامہ جمع کرانا لازمی ہے۔
4. ایسے طباء کے لیئے، جن کے پاس مجاز معالج کا آرڈر موجود ہے، FCPS، FCHD اور SACC کا عملہ دینا ہے۔
5. ایسے طباء کے عملے کے علاوہ کوئی فرد کر سکتا ہے، جو علامات ظاہر ہونے کا مشابہ نہیں کر سکتا اور نہ بی اسے، ایسے طباء کو epinephrine دینے سے پہلے علامات ظاہر ہونے کا انتظار کرنے کی اجازت ہے۔
6. دواوں کے اوپر لازماً فارماسیٹ کا لیبل لگا بونا چاہئے۔ اگر معالج کے آرڈر میں epinephrine انجیکشن کی خوارک دہرانا درج ہے تو اس صورت میں والد والدہ یا سرپرست کے لیئے، لازمی طور پر اسکول کو دو epinephrine/ سرنجز فرائم کرنے لازمی ہیں۔ ایسے طباء علم جو اپنے پاس ذاتی ایبی نیفرين رکھتے ہیں، انکے والدین کیلئے بیک اپ کے طور پر اسکول کے بیلتھ روم یا منظور شدہ جگہ پر رکھنے کیلئے دوا فرائم کرنا لازمی ہے۔ دوا کی معیاد ختم ہونے کی تاریخ انجیکٹر/ سرنج یا فارمیسی کے لیبل پر لازمی درج ہونا چاہئے۔ جب والد/ والدہ یا سرپرست کو یہ اطلاع دی جائے کہ موجودہ انجیکٹر/ سرنج کی معیاد ختم ہو گئی ہے یا اسے استعمال کر لیا گیا ہے تو انہیں متبادل epinephrine فرایم کرنی ہو گی۔
7. والد والدہ یا سرپرست ایبی نیفرين بذات خود اسکول کے بیلتھ روم میں دین الیہ کہ طباء علم کے لئے اسے اپنے پاس اسکول یا SACC میں رکھنے کی اجازت ہو۔
8. جب تک طباء علم کو epinephrine اپنے پاس رکھنے کا اختیار نہ دیا جائے گا، والد والدہ یا سرپرست کو چاہئے کہ دوا استعمال کرنے کی مدت کے خاتمے کے ایک بقٹے کے اندر یا اسکول کے تعییبی سال کے آخری دن غیر استعمال شدہ epinephrine آکر لے جائیں۔ اس وقت کے دوران ایبی نیفرين واپس نہیں لی کنی تو اسے تلف کر دیا جائے گا۔

فینر فیکس کاؤنٹی پلک اسکولز کے طباء علموں کے تعییبی ریکارڈ سے معلومات اس شرط پر جاری کی جاتی ہیں کہ انہیں وصول کرنے والا فرد اس بات پر رضا مند ہے کہ وہ والدین یا اپل طباء علم کی رضا مندی کے بغیر، یہ معلومات کسی دوسرے فریق کی دسترس میں جائے کی اجازت نہیں دے گا۔