

لوحظ أن طفلك مصاب بقمل حي. الآباء أو الأوصياء لديهم دور مهم في علاج القمل ومنع القمل من العودة. انظر الكتيب للحصول على وصف للقمل الموجود على موقع FCHD <https://www.fairfaxcounty.gov/health/schools>

تحقق من شعر كل فرد في المنزل ، حتى لو لم تظهر عليهم علامات الإصابة بالقمل ، مثل الحكّة. اطلب من شخص ما التحقق منك!

العلاج مع الاتحادية إدارة الغذاء والدواء يجب استخدام العلاج المضاد للقمل المعتمد من (FDA) فقط على الأشخاص الذين يعانون من القمل الحي. بالنسبة للأطفال دون سن الثانية من العمر والنساء الحوامل أو المرضعات، يرجى استشارة مقدم الرعاية الصحية للحصول على المشورة العلاجية.

بعد العلاج الأول ، أكمل نموذج التحقق من علاج القمل من غرفة الصحة المدرسية. أعد النموذج إلى غرفة الصحة المدرسية لطفلك عند عودته.

أبلغ الوالد / الوصي على جهات الاتصال الوثيقة لطفلك بأن طفلك مصاب بالقمل.

نظف الملابس والفرش والألعاب الناعمة باستخدام الماء الساخن والمجففات الساخنة (لمدة 20 دقيقة على الأقل). يجب إغلاق العناصر التي لا يمكن غسلها في كيس بلاستيكي لمدة 14 يوما.

فراغ السجاد والمفروشات ومقاعد السيارات. لا تستخدم أي مبيدات حشرية داخل منزلك.

قم بتطهير جميع الأمشاط والفرش من منزلك ثم اغسلها بالماء الساخن يوميا. يتم التطهير عن طريق نقع الأمشاط والفرش في شامبو مضاد للقمل معتمد من إدارة الأغذية والعقاقير لمدة ساعة واحدة أو غليها في الماء لمدة 5-10 دقائق.

تراجع طفلك بعد العلاج الأول وفقا للتعليمات الموجودة على الصندوق أو الملصق. أعد نموذج التحقق الثاني من علاج القمل إلى غرفة الصحة المدرسية لطفلك.

فحص وتمشيط شعر طفلك بمشط ببيض القمل (الصئبان) لإزالة القمل ، كل يوم لمدة 14 يوما بعد العلاج الأول.

استمر في فحص رأس طفلك كل 2-3 أيام لمدة 2-3 أسابيع على الأقل.

اتصلي بمقدم الرعاية الصحية للحصول على المشورة إذا اتبعت جميع الخطوات وكان طفلك لا يزال يعاني من القمل الحي.

استخدم تقويم علاج القمل لمساعدتك على اتباع جميع خطوات العلاج.

تقويم علاج القمل

اليوم 1	اليوم 2	اليوم 3	اليوم 4	اليوم 5	اليوم 6	اليوم 7
<p>1. استخدم علاجاً مضاداً للقمل معتمداً من إدارة الأغذية والعقاقير. اتبع الاتجاهات تماماً كما هو الحال في ملصق المنتج.</p> <p>2. اغسل الملابس والفرش والألعاب الناعمة. قم بتعبئة الأكياس التي لا يمكن غسلها في كيس بلاستيكي مختوم بإحكام لمدة 14 يوماً.</p> <p>3. إخطار جهات الاتصال المقربة.</p> <p>4. احصل على نموذج التحقق من القمل من غرفة الصحة المدرسية للطفل. أكمل النموذج بمجرد الانتهاء من العلاج.</p>	<p>أعد نموذج التحقق من القمل إلى غرفة الصحة المدرسية للطفل.</p> <p>لا تغسل شعر طفلك بأي نوع من الشامبو.</p> <p>بلي شعر طفلك وقسميه إلى أقسام صغيرة. استخدم مشط بيضة القمل (الصنبان) وقم بتمشيط رأس طفلك بالكامل.</p>	<p>استخدم الشامبو العادي لغسل شعر طفلك.</p> <p>اتبع تعليمات الأوس وقم بتمشيط شعر الطفل بمشط الصنبان.</p>	<p>استخدم الشامبو العادي لغسل شعر طفلك.</p> <p>مشط من خلال شعر الطفل مع مشط الصنبان.</p>	<p>استخدم الشامبو العادي لغسل شعر طفلك.</p> <p>مشط من خلال شعر الطفل مع مشط الصنبان.</p>	<p>استخدم الشامبو العادي لغسل شعر طفلك.</p> <p>مشط من خلال شعر الطفل مع مشط الصنبان.</p>	<p>استخدم الشامبو العادي لغسل شعر طفلك.</p> <p>مشط من خلال شعر الطفل مع مشط الصنبان.</p>
اليوم 8	اليوم 9	اليوم 10	اليوم 11	اليوم 12	اليوم 13	اليوم 14
<p>استخدم الشامبو العادي لغسل شعر طفلك.</p> <p>مشط من خلال شعر الطفل مع مشط الصنبان.</p>	<p>عالج طفلك للمرة الثانية باستخدام علاج مضاد للقمل معتمد من إدارة الأغذية والعقاقير، بعد 9-10 أيام من العلاج الأولي، أو وفقاً للتعليمات الموجودة على الصندوق أو الملصق.</p> <p>مشط من خلال شعر الطفل مع مشط الصنبان.</p>	<p>أعد نموذج التحقق من القمل إلى غرفة الصحة المدرسية للطفل.</p> <p>لا تغسل شعر طفلك بأي نوع من الشامبو.</p> <p>مشط من خلال شعر الطفل مع مشط الصنبان.</p>	<p>استخدم الشامبو العادي لغسل شعر طفلك.</p> <p>مشط من خلال شعر الطفل مع مشط الصنبان.</p>	<p>استخدم الشامبو العادي لغسل شعر طفلك.</p> <p>مشط من خلال شعر الطفل مع مشط الصنبان.</p>	<p>استخدم الشامبو العادي لغسل شعر طفلك.</p> <p>مشط من خلال شعر الطفل مع مشط الصنبان.</p>	<p>استخدم الشامبو العادي لغسل شعر طفلك.</p> <p>مشط من خلال شعر الطفل مع مشط الصنبان.</p> <p>إذا كنت لا تزال ترى القمل الحي أو بيض القمل بعد اتباع كل هذه الخطوات، فيجب عليك الاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك.</p>