





에피네프린 투여를 위한 대응 행동 단계 (아래 섹션은 학교 공중 보건 간호사 (PHN)가 작성해야 함)

1. 항상 표준 예방 조치를 따를 것.
2. 에피네프린을 즉시 투여할 것. **아래의 투여 설명서를 참조하기 바람.** 투여 시간을 기록할 것.
3. **911에 전화할 것.**
4. 다리를 올린 상태로 평평하게 눕히거나, 보온을 유지하거나, 편안한 자세로 눕힐 것.
5. **처방이 있는 경우, 다른 의약품**을 제공할 것: _____
6. 학생이 의식을 잃으면, 호흡을 확인하고 필요한 경우 심폐소생술을 시작할 것.
7. 학부모(들) 또는 비상 연락인에게 통보할 것.
8. 에피네프린 라벨에 학생의 이름, 에피네프린 투여 시간 및 날짜를 기재할 것.
9. **처방이 있는 경우** 그리고 응급 의료 서비스가 도착하지 않은 경우, 에피네프린 투여를 반복할 것.
10. 의약품 차트에 에피네프린 투여를 기록할 것.
11. 사용한 에피네프린은 응급 의료 서비스 또는 학부모에게 전달할 것.
12. 응급 의료 서비스가 학생을 이송할 경우, 현 비상 연락 정보 양식의 사본을 제공할 것.

에피네프린이 보관된 장소: 보건실 직접 휴대 기타: _____

개별적 고려사항: _____

학교 공중 보건 간호사 (PHN)가 받은 에피네프린의 유형을 표기:

<input type="checkbox"/> EPIPEN® AUTOINJECTOR	<input type="checkbox"/> GENERIC EPINEPHRINE AUTOINJECTOR	<input type="checkbox"/> AUVI-Q® AUTOINJECTOR	<input type="checkbox"/> TEVA GENERIC AUTOINJECTOR
<p>DIRECTIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Remove EpiPen Auto-Injector from plastic carrying case. 2. Pull off blue safety release cap. 3. Hold leg to stabilize. 4. Place orange tip against mid-outer thigh and firmly push. <u>Press firmly and hold for 3 seconds.</u> 5. Remove and massage the area for 10 seconds. 	<p>DIRECTIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Remove the outer case. 2. Remove both end caps (1 and 2). 3. Hold the leg to stabilize. 4. Place rounded tip against mid-outer thigh. 5. Press down hard until needle penetrates. <u>Hold for 10 seconds.</u> 6. Remove and massage the area for 10 seconds. 7. Needle will be exposed; dispose of per training. 	<p>DIRECTIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Remove the outer case; voice command automatically activates. 2. Pull off red safety guard. 3. Hold leg to stabilize. 4. Place black end against mid-outer thigh. 5. <u>Press firmly and hold for 2 seconds.</u> 6. Remove and massage the area for 10 seconds. 	<p>DIRECTIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. There is no outer case for this device. 2. Twist the yellow or green cap in the direction of the "twist arrow" to remove cap. 3. Pull off the blue safety release cap. 4. Hold leg to stabilize. 5. Place orange tip against mid-outer thigh and firmly push until you hear a click. <u>Hold firmly in place for 3 seconds.</u> 6. Remove and massage the area for 10 seconds.
			

에피네프린 사용 절차에 관한 학부모/보호자를 위한 정보

1. 에피네프린은 의료 서비스 제공자와 학부모 또는 보호자 모두가 서명한 허가서에 한하여 학교, 학교가 후원하는 활동 또는 SACC에서만 투여할 수 있습니다.
2. 이 양식은 학교 보건실 또는 기타 승인된 장소에 보관되어야 합니다. 파트 II에 있는 의료 서비스 제공자의 처방을 받는 것은 학부모 또는 보호자의 책임입니다. SACC에 참여하는 학생의 경우, 에피네프린 투여 허가서의 사본이 반드시 SACC에 있는 파일에 보관되어야 합니다.
3. 새로운 양식은 매 학년도마다 그리고 에피네프린의 투여량이나 투여 조건에 변경이 있을 때마다 학교에 제출되어야 합니다.
4. 미리 측정된 투여량의 에피네프린에 한해서만 FCPS, FCHD, SACC 직원들이 투여할 수 있습니다.
5. 승인된 의료 서비스 제공자의 처방이 있는 학생들을 위한 에피네프린은 훈련된 그러나 면허를 소지하지 않은 비의료 직원에 의해 FCPS 또는 SACC에서 투여될 수 있는데, 이들은 에피네프린을 투여하기 전에 증상의 발현을 주시할 수 없으며 증상이 나타날 때까지 기다릴 수도 없습니다.
6. 의약품에는 반드시 약사가 정확하게 표기한 라벨이 부착되어 있어야 합니다. 의료 서비스 제공자의 처방에 에피네프린의 반복 투여가 포함된 경우, 학부모 또는 보호자가 반드시 학교에 두 개의 에피네프린 주사기/주입기를 제공해야 합니다. 학생 본인이 에피네프린을 휴대하는 경우, 학부모 또는 보호자는 보건실이나 기타 승인된 장소에 보관되는 예비용 에피네프린을 반드시 학교에 제공해야 합니다. 유통 기한은 반드시 약국 라벨에 또는 주사기/주입기에 명확하게 표기되어 있어야 합니다. 학부모 또는 보호자는 현재 보관되어 있는 주사기/주입기의 유통 기한이 지났거나 모두 사용되었다는 통지를 받았을 때 반드시 교체할 에피네프린을 제공해야 합니다.
7. 학생이 학교 시간 및 SACC 시간 동안 에피네프린을 휴대해도 된다고 허락받지 않는 한, 학부모 또는 보호자는 학교 보건실로 에피네프린을 직접 전달해야 합니다.
8. 학생이 에피네프린을 휴대해도 된다고 허락받지 않는 한, 학부모 또는 보호자는 이 허가서가 만료된 후 1주일 이내 또는 학년 종강일에 사용하지 않은 모든 에피네프린을 회수해 가야 합니다. 해당 기간 내에 회수되지 않은 에피네프린은 모두 폐기될 것입니다.